

Африканская чума свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – вирусная болезнь домашних и диких свиней, при которой смертность достигает 100 %. Заболевание неопасно для человека.

Распространение болезни

Болезнь известна с начала XX века и отмечалась в странах Африки, Европы и в СССР. С 2007 года африканская чума свиней регистрируется в России. На начало декабря 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано 140 **неблагополучных по АЧС** пунктов (68 - среди домашних свиней, 72- среди диких кабанов). На отчетную дату нездоровленными остаются 47 очагов (13 - среди домашних свиней, 34- среди диких кабанов)..Всего за период с 2007 по 2022 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 2212 вспышек африканской чумы свиней (1321 - среди домашних свиней, 891 - среди диких кабанов). . Вспышки болезни также регистрируются в Белоруссии, на Украине и в странах Евросоюза – Венгрии, Италии, Латвии, Румынии, а так же в Таиланде и ЮАР. Существует постоянная угроза возникновения новых очагов АЧС.

Опасно для животных

АЧС - относится к особо опасным болезням. Болеют свиньи всех пород и возрастов в любое время года. Болезнь очень быстро распространяется, все свинополовое хозяйство, куда проникает вирус, погибает. Наносит огромный экономический ущерб. Всего в стране с 2007 по 2021 год при ликвидации очагов африканской чумы свиней уничтожено свыше 1 млн. свиней. Прямой ущерб от АЧС, по оценке Минсельхоза России и Россельхознадзора превысил 30 млрд. руб.

Заражение и симптомы болезни

Здоровые свиньи заражаются при контакте с больными и переболевшими, через загрязнённые выделения больных животных, пастбища, корма, воду, предметы ухода, транспортные средства, а также трупы павших свиней и продукты убоя зараженных свиней. Переносчики - домашние и дикие животные, птицы, грызуны, насекомые. Распространению болезни способствует использование в корм свиньям необезвреженных столовых отходов.

От заражения до появления симптомов болезни проходит от 2 до 7 дней. Затем у животных повышается температура тела до 42 °С, появляются одышка, кашель, пропадает аппетит, повышается жажда, появляются приступы рвоты и параличи задних конечностей, на коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания ушей, пятке и хвосте становятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже позднее.

Лечение и средства профилактики

Лечение больных животных запрещено, средства профилактики не разработаны, вакцины против африканской чумы свиней нет.

Если диагноз на африканскую чуму свиней установлен

В случае установлении диагноза заболевания свиней африканской чумой на неблагополучное хозяйство накладывается карантин. Все свиньи, независимо от возраста и признаков заболевания, в неблагополучном очаге и в радиусе 20 км от него обязательно изымаются и умерщвляются бескровным методом. Убой на мясо животных запрещается. Трупы павших и убитых свиней, продукцию животного происхождения, остатки кормов, навоз, тару и малоценный инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают. Проводят дезинфекцию помещений, загонов и других мест содержания животных, а также мероприятия по уничтожению грызунов насекомых и клещей. Запрещается продажа на рынках продуктов животноводства всех видов и вывоз за пределы очага в течение всего срока карантина (30 дней с момента убоя всех свиней и проведения комплекса ветеринарно-санитарных мероприятий), а также в последующие 6 месяцев - свиней и продукции свиноводства; запрещается вывоз из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение свиней в хозяйствах разрешается только через год после снятия карантина.

Рекомендации владельцам свиноводческих хозяйств

Чтобы предотвратить занос африканской чумы свиней необходимо:

- исключить доступ посторонних лиц в свои хозяйства, не допускать подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы свинины специалистами государственной ветеринарной службы Московской области;
- исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без их проварки;
- корма для свиней покупать только промышленного производства, прошедшие термообработку;
- содержать поголовье только закрытым способом (в сараях, свинарниках);
- не допускать контакта свиней с другими животными и свободного выгула их, особенно в лесной зоне;
- каждые 10 дней обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох);
- постоянно вести борьбу с грызунами;

– не приобретать живых свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней;

– не завозить свиней и продукцию свиноводства из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой Московской области;

– немедленно сообщать обо всех случаях заболевания или внезапного падежа свиней в государственные учреждения ветеринарии Московской области по зонам обслуживания или на телефон горячей линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ. Соблюдение этих рекомендаций позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь.